

## Rougegorge familier



### Identification :

Le rougegorge familier est aisément reconnaissable avec sa poitrine et la face rouge orangé, contrastant avec les parties inférieures blanchâtres. Les parties supérieures son brun-vert-olive, ainsi que les *ailes* et la queue.  
Le *bec* conique est brun foncé avec la base claire. Les yeux sont noirs. Les *pattes* fines et les *doigts* sont brun clair.

Le *juvénile* a les parties inférieures densément tachetées de brun. Jusqu'à sa première *mue*, il lui manquera la tache rouge de l'adulte.

**Chant :** Son *chant* est une série de gazouillis ténus, doux et clairs, et de courts trilles, avec des arrêts brusques. Pendant l'automne, son *chant* est plus doux.



Son extrait des CD 'Tous les Oiseaux d'Europe' de Jean C. Roché avec l'aimable autorisation de Sittelle et CEBA.

**Habitat :** Le rougegorge fréquente les terrains boisés, le *bocage*, les *taillis*, les forêts, les parcs et les jardins aussi bien dans les régions les plus isolées que dans les villes.



La femelle bouge sur de courtes distances après la saison de reproduction, jusqu'à un territoire hivernal proche où elle pourra se nourrir. Le mâle garde le même territoire toute l'année.

**Comportements :** Quand il est sur le sol, il prend une posture dressée. Il agite ses *ailes* et sa queue en permanence. Il vole d'un perchoir bas à un autre en voletant. Quand il est en alerte, il agite et dresse sa queue. On le voit souvent près des habitations. Il entre parfois dans les maisons.

Ce sont des oiseaux agressifs, et ils se battent entre mâles d'une façon haineuse, et ces combats peuvent voir la mort de l'un des deux adversaires. Ils sont hautement territoriaux, exposant leur poitrine orange vers tout intrus. Les combats débutent par des coups à l'intrus, donnés avec les *pattes* et les *ailes*, ou en délogeant l'oiseau de son perchoir. Ensuite, les deux opposants commencent à rouler sur le sol, et à voltiger l'un face à l'autre en donnant des coups de griffes. Chaque oiseau essaie de clouer son rival au sol. Les combats peuvent durer une minute, une heure ou bien plus.



**Vol :** Le rougegorge vole bas et voltige sous le couvert végétal.

**Nidification :** La femelle construit le nid, en le cachant dans la végétation dense. C'est une structure en forme de dôme, faite avec des feuilles, de la mousse et des *plumes*, et tapissé de radicelles et de poils. Le nid peut être situé dans n'importe quel endroit où il peut s'installer.



La femelle dépose 5 à 7 oeufs blancs avec des taches rouges. L'incubation dure de 11 à 14 jours, assurée par la femelle qui est nourrie trois fois par heure par le mâle. Les poussins sont *nidicoles*, nourris et protégés par les parents. Ils quittent le nid au bout de 12 à 15 jours après la naissance, et deviennent indépendants à l'âge de trois semaines.

Cette *espèce* produit deux à trois *couvées* par an.

**Régime :** Le rougegorge familier se nourrit essentiellement d'*insectes* et de petits invertébrés, mais aussi de petites graines, de fruits et de baies. Il peut fréquenter les mangeoires en hiver.

**Protection / Menaces :** Le rouge gorge est largement répandu dans la majeure partie de l'Europe.

### Autres liens :

[Rougegorge familier](#) du site La plume  
[lucn](#)  
[Birdlife](#)



**ROUGEGORGE FAMILIER**  
*Erithacus rubecula*



**Ordre :** Passeriformes

**Famille :** Turdidés

**Biométrie :**


Taille : 14 cm

Envergure : 20 à 22 cm


Poids : 16 à 22 g

**Longévité :** 15 ans

**Statut de conservation IUCN :**



**Distribution :**



**Synonymes :** Rödhake (sv), European Robin (en), Pettirosso (it), Petirrojo (es), Rotkehlchen (al), Roodborst (nl)

Fiche créée le 07/11/2002 par *Didier Collin*

Qui sommes-nous ? [L'association](#) | [Mentions légales](#) | [Sources](#) | [Contacts](#) | [Version imprimable](#)  
Mis à jour le 11/12/2008 05:22:04 - © 1996-2008 Oiseaux.net