

# Barge à queue noire - Limosa limosa - Black-tailed Godwit

Oiseaux.net

- 
- [Accueil](#)
- [Listes](#)
- [Charadriiformes](#)
- [Scolopacidés](#)
- Fiche
- [Distribution](#)
- [Photos](#)

## Limosa limosa - Black-tailed Godwit



### Systematique

- Ordre  
:  
Charadriiformes
- Famille  
:  
Scolopacidés
- Genre  
:

## Limosa

- Espèce

:

limosa

### Descripteur

### Biométrie

- Taille

: 44 cm

- Envergure

: 70 à 82 cm.

- Poids

: 244 à 500 g

### Distribution




## Description de la famille

Les Scolopacidés constituent, avec les Charadriidés, un groupe d'oiseaux appelés limicoles, c'est à dire littéralement "oiseaux de rivages". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l'hémisphère nord, mais seul le continent antarctique en est dépourvu. Ce sont des ois... [lire la suite](#)

## Identification



♂ adulte plum. nuptial



♀ adulte plum. nuptial

Chez la barge à queue noire, le mâle est plus petit et plus coloré que la femelle, avec un [bec](#) légèrement plus court.

**En plumage nuptial**, le sommet du crâne et la nuque sont roussâtres, striés de brun. Le [sourcil](#), le menton et le dessous de l'oeil sont blancs. Une raie brune parcourt la face de l'oeil jusqu'au [bec](#). Les [joues](#), la face antérieure et les côtés du cou, la poitrine et le ventre sont d'une teinte rouille claire dorée. Le plumage de la poitrine est barré horizontalement de stries foncées et les flancs sont ornés d'écailles brunes. Le ventre et les sous-caudales sont blancs, contrastant avec le dos et les scapulaires d'un brun-marron brillant. Les [couvertures alaires](#) sont généralement grises, les grandes largement bordées de blanc, laissant apparaître en vol une tache claire nettement visible. Le croupion est blanc, ainsi que les sus-caudales. La queue est blanche à la base, noire dans sa partie terminale, le noir et le blanc étant nettement séparés. Le [bec](#) est très long, rose au jaunâtre à la base, corne à la pointe, se relevant très légèrement dans le dernier tiers.

**En plumage hivernal**, [sourcils](#), menton, bas de la poitrine et ventre deviennent d'un blanc pur. La tête, le cou et les flancs prennent une teinte gris clair uniforme, parfois légèrement soulignée de roux. Tout le dessus est gris foncé avec la bordure des [plumes](#) plus claire. Quelques taches discrètes continuent à marquer le dessus de la tête, les côtés du cou et les flancs. Le [miroir](#) de l'aile s'obscurcit. Seuls le croupion et la queue demeurent inchangés.

**En toutes saisons**, l'intérieur des [ailes](#) est blanc, avec de fines taches sombres sur la partie

supérieure.

## Indications subspécifiques 4 sous-espèces

- *Limosa limosa limosa* (w and c Europe to c Asia)
- *Limosa limosa islandica* (Iceland, Faroe and Shetland Is., n Norway)
- *Limosa limosa melanuroides* (c and e Asia)
- *Limosa limosa bohaii* ()

## Noms étrangers

- [Black-tailed Godwit](#),
- Aguja colinegra,
- milherango,
- Uferschnepfe,
- [nagy goda](#),
- Grutto,
- Pittima reale,
- rödspov,
- Svarthalespove,
- brehár čiernochvostý,
- břehouš černoocasý,
- Stor Kobbersneppe,
- mustapyrstökuiiri,
- Swartstertgriet,
- tètòl cuanegre,
- Jađrakan,
- русык,
- melnā puskuitala,
- črnorepi kljunač,
- Большой веретенник,
- Biru-laut ekor-hitam,
- オグロシギ,
- 黑尾塍鹬,
- นกปากแฉ่นหางดำ,
- 黑尾鹬（黑尾塍鹬）,

## Voix chant et cris



♂ adulte

- play
- 

Les barges à queue noire sont assez bruyantes et démonstratives pendant la période de reproduction, produisant des *Oui-kè ouikè ouikè* assez puissants en volant haut dans le ciel. Le reste de l'année, les barges demeurent à peu près muettes, se bornant à émettre des grognements rappelant ceux de la bécasse avec des intonations diverses, suivant qu'elles veulent exprimer une interrogation, une crainte ou une satisfaction.

## Habitat



Sans être exclusivement maritime, la barge à queue noire préfère l'eau salée aux marais d'eau douce. En France, elle se tient plus volontiers sur les sables et les vases maritimes lors de ses passages mais elle montre également une certaine prédilection pour les étendues d'eau saumâtre telles que la Camargue et certains marécages du sud-est de l'Europe.

## Comportement traits de caractère



adulte plum. nuptial

Les barges à queue noire nichent autour de la Baltique, dans toute l'Europe Centrale et la région [balkanique](#) ainsi qu'en Sibérie Occidentale où leurs implantations ne dépassent pas à l'est le cours du Ienisseï.



adulte

Leur hivernage ne se fait pas aussi loin au sud qu'on le supposait autrefois. Elles ne dépassent guère l'Equateur et s'installent aux Canaries, aux îles du Cap-Vert, au Tchad, vers les sources du Nil et sur les bords du golfe Persique. Dès la fin août, on peut les apercevoir au cours de leurs passages qu'elles effectuent en petits groupes disciplinés en compagnie d'échassiers plus petits. Au début mars, elles sont de retour pour le trajet inverse. En effet, ces oiseaux arrivent assez tôt sur nos côtes, avant même d'avoir revêtu leur beau plumage. Ils sont d'abord présents en Camargue puis ne tardent pas à apparaître sur les côtes du sud-ouest, puis aux embouchures de certains fleuves comme la Loire et la Vilaine. Ils peuvent même remonter certains fleuves et séjourner sur les rives mais, début avril, leur observation devient très rare car la plupart ont regagné leurs quartiers nordiques.

## Vol



adulte plum. nuptial

Les [pattes](#) dépassent de la queue en vol.

## Alimentation mode et régime



1ère année

Malgré ses longues échasses, la barge avance à pas comptés, entrant profondément dans l'eau où elle ne nage toutefois que contrainte et forcée.



adulte plum. transition

Pour fouiller la vase, son corps bascule autour de l'articulation du [tarse](#), la queue pointant vers le ciel, tête cou et [bec](#) profondément immergés à la recherche de vers, de [larves](#) et de petits [crustacés](#). Cependant, elle ne cherche pas toujours sa nourriture dans l'eau, mais aussi dans le sable, dans les labours, les prairies où elle fait la chasse aux lombrics aussi habilement que les bécassines.

## Reproduction nidification



adulte plum. nuptial

La barge à queue noire niche le plus souvent en [colonies](#) sur les dunes maritimes et dans les polders, se bornant à creuser une dépression qu'elle garnit très sommairement de brindilles.



adulte plum. nuptial

Elle y dépose 4 oeufs fauves tachetés de deux tons foncés. L'éclosion a lieu au bout de moins de trois semaines d'incubation et les poussins, aux [pattes](#) démesurées, un peu chancelants au début, couverts d'un [duvet](#) roux sur le dos, blancs sur les parties inférieures, avec les taches habituelles,

sont capables de voler un mois après la sortie de l'oeuf. Pendant toute la durée de l'incubation, les mâles ne cessent de voler au dessus de la couveuse, se livrant à des joutes et à des acrobaties aériennes accompagnées d'un [chant](#) assez doux et harmonieux à la façon des vanneaux. Si un visiteur, humain ou animal, à l'exception des bestiaux qui sont considérés comme des amis, s'approche de la [colonie](#), tous les oiseaux assurent une défense collective, volant autour de lui et faisant entendre un concert de cris aussi variés que discordants.

## Distribution



## Menaces - protection

### Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE