


Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla - Short-toed Treecreeper

Oiseaux.net

Description de la famille

La famille des Certhiidés est une petite famille (2 genres et 11 espèces) d'oiseaux forestiers sédentaires, très adaptés à la vie sur les troncs et les branches des arbres. Ils s'y déplacent de bas en haut par petits bonds en agrippant à l'écorce avec leurs ongles acérés et se servent de ... [lire la suite](#)

Identification



adulte



adulte

Les grimpereaux sont de petits [passereaux](#) très adaptés à une vie [arboricole](#) et plus précisément corticole. Ils se déplacent un peu à la façon des pics sur les troncs et les branches, de bas en haut, en s'aidant de leur queue comme stabilisateur. Leurs parties supérieures sont très homochromes avec l'écorce des arbres. Elles apparaissent d'un brun moyen, très marquées qu'elles sont de chamois et de brun sombre. En Europe, deux [espèces](#) proches cohabitent, les Grimpereaux des bois et des jardins. Ils sont très semblables d'aspect et de détermination délicate. Nous insisterons sur les caractères distinctifs.

Sur le terrain, la voix est le meilleur critère (chapitre suivant). Ensuite vient la couleur des flancs. Le Grimpereau des jardins (Gdj) présente des flancs brun roussâtre à brun grisâtre alors que le [Grimpereau des bois](#) (Gdb) les a blanchâtres à très légèrement roussâtres. Puis nous avons deux critères pas du tout faciles à apprécier sur le terrain, la longueur respective du [bec](#) et de l'ongle du [doigt](#) postérieur. Chez le Gdj, le [bec](#) est jugé long tandis que l'ongle est court, égal ou légèrement plus court que le [doigt](#). Chez le Gdb c'est l'inverse. Le [bec](#) paraît court tandis que l'ongle est plus long que le [doigt](#) qui le porte. Sur photos, cela se voit bien. Enfin, il y a des critères [alaires](#) imparables, mais qui supposent de bonnes photos de profil ou de 3/4 arrière. Ils concernent la disposition du blanc sur l'alula noirâtre, la [morphologie](#) de la barre crème des [rémiges](#) et le patron de la projection [primaire](#). Les détailler ici serait fastidieux et probablement incompréhensible. Reportez-vous plutôt aux photos qui les illustrent dans les galeries et comparez les.

Confusion possible

Distinguer [le Grimpereau des jardins du Grimpereau des bois](#). Article disponible sur notre site et notre [forum](#).

Indications subspécifiques 5 sous-espèces

- Certhia brachydactyla brachydactyla (s, c and se Europe from se Spain to Turkey)
- Certhia brachydactyla megarhynchos (w Europe from Portugal and nw Spain to w, n France and w Germany)
- Certhia brachydactyla mauritanica (nw Africa)
- Certhia brachydactyla dorotheae (s Greece, Crete and Cyprus)
- Certhia brachydactyla rossocaucasica (nw Caucasus)

Noms étrangers

- [Short-toed Treecreeper](#),
- Agateador europeo,
- trepadeira-do-sul,
- Gartenbaumläufer,
- [rövidkarmú fakusz](#),
- Boomkruiper,
- Rampichino comune,
- trädgårdsträdskrypare,
- Kortklotrekryper,
- kôrovník krátkoprstý,
- šoupálek krátkoprstý,
- Korttået Træløber / Parktræløber,
- etelänpuukiipijä,
- raspinell comú,
- Garðfeti,
- pełzacz ogrodowy,
- ĭspirkstu mizložŋa,
- kratkoprsti plezalček,

- Короткопалая пищуха,
- タンシキバシリ,
- 短趾旋木雀,
- trädgårdsträdkrypare,
- 短趾旋木雀,

Voix chant et cris



adulte

- play
-

Le [chant](#) du Gdj est une ritournelle brève (un peu plus d'une seconde), stéréotypée, sonore et claire et pouvant s'écrire "tit tit tiTuiutit". Le cri a la tonalité du [chant](#). C'est un "tjit" appuyé, répété plusieurs fois. On entend aussi lors des déplacements des "siiih" incisifs qu'il ne faut pas confondre avec les "siiiih" plus fins et plus incisifs encore du Gdb. Notons enfin des "tititi" égrainés à l'occasion comme cris de contact discrets.

Habitat



adulte

Le Grimpereau des jardins est à l'origine un oiseau forestier lié aux facies [feuillus](#) de basse altitude, particulièrement la vieille chênaie.

Le nombre de vieux arbres doit être important mais il préfère la futaie un peu claire. Il apprécie le bord des eaux et les ripisylves qui s'y développent. Les activités humaines lui ont procuré de nombreux habitats [secondaires](#) favorables, parcs, y compris urbains, vieux vergers, vieilles peupleraies, [haies](#) arborées, cimetières avec vieux arbres, etc. L'espèce est essentiellement sédentaire.

En France, il monte jusqu'à la limite inférieure des conifères au-delà de laquelle il laisse la place

à son congénère. Dans cette zone limite, le Gdj est dans les [feuillus](#) des parcs et vergers, en vieille frênaie, tandis que le Gdb est en forêt coniférienne ou mixte. Dans le sud de son [aire](#), il peut monter jusqu'à 2 000 m, par exemple au Maghreb ou en Turquie, et alors habiter des facies mixtes, par exemple à pins, cèdres et chênes.

Comportement traits de caractère



adulte

Les grimpereaux sont vraiment adaptés à une vie [arboricole](#) exclusive. Ils ont la couleur des écorces sur lesquelles ils sont pratiquement invisibles quand ils ne bougent pas.



adulte

Très actifs, ils circulent vivement, s'accrochant à l'écorce de leurs [pattes](#) munies de quatre [doigts](#) aux [ongles](#) acérés. Comme les pics, ils s'appuient sur leur queue rigide pour se stabiliser lors des arrêts. Leur habitude est d'inspecter les arbres de bas en haut, du tronc jusqu'aux rameaux. Ils ne descendent pas tête en bas comme le fait la sittelle par exemple. Tout au plus peuvent-ils se retrouver la tête vers le bas quand ils inspectent le dessous des branches. Ils regagnent le bas des arbres au vol. Ils se reposent accrochés verticalement contre un tronc ou une branche. C'est d'ailleurs dans cette position qu'ils passent la nuit, le plumage gonflé et la tête sous l'aile. En dehors de la période de reproduction, ils mènent une vie plutôt solitaire. En hiver, ils s'associent parfois aux troupes de mésanges, roitelets et autres sittelles qui parcourent le milieu forestier en groupe pour mieux se protéger des prédateurs et optimiser la recherche de nourriture.

Vol



adulte

Les grimpereaux ont des [ailes](#) courtes et larges qui leur permettent une grande agilité en milieu arboré. Leur vol d'un arbre à l'autre est direct et onduleux, avec un freinage à l'arrivée suivi d'une ressource.

Alimentation mode et régime



adulte

Les grimpereaux recherchent leur nourriture sur les troncs et les branches, dont ils inspectent minutieusement l'écorce et les épiphytes pour y dénicher les invertébrés et leurs formes de résistance, et ceci en toutes saisons car ils sont sédentaires.



adulte

Leur [bec](#) fin et arqué n'est pas fait pour travailler le substrat, mais seulement pour s'insinuer dans les interstices à la recherche des proies. Ces proies sont surtout des [insectes](#) et des araignées ainsi que les formes de résistance des premiers, œufs, [larves](#) et [chrysalides](#).

Reproduction nidification



adulte

La saison de reproduction s'étend de mars à juillet avec bien sûr un décalage en fonction de la latitude et de l'altitude.



adulte

En plaine française, il se reproduit d'avril à juin. Il a été prouvé que le Gdj était occasionnellement polygame

Le plus souvent, le Grimpereau des jardins nidifie derrière l'écorce soulevée d'un arbre mort ou mal en point. Toute autre anfractuosité, fente ou crevasse dans un tronc ou une branche peuvent aussi convenir. Ce peut être également dans du lierre le long d'un tronc. Le mâle construit plusieurs ébauches de nid et c'est la femelle qui fait son choix et finit le travail. Le nid est à une hauteur variable mais le plus souvent entre 4 et 10 m. Il est fait de brindilles, d'herbes, de morceaux d'écorce et d'objets singuliers comme des bouts de chiffon ou de papier. La coupe est tapissée de radicelles, de poils et de [plumes](#), de mousse et de lichens. La femelle y pond 5 à 7 œufs blancs tachetés de brun-rouge au gros bout qu'elle couvera seule 13 à 15 jours. Les jeunes sont nourris au nid par les deux adultes 15 à 18 jours après quoi ils quittent le nid, toujours entourés des soins de leurs parents. D'habitude une seconde [nichée](#) suit. Il arrive même que les deux se télescopent. Dans ce cas, le mâle finit l'élevage des jeunes tandis que la femelle en est à la préparation de son deuxième nid.

Distribution



adulte plum. nuptial

L'aire de distribution du Gdj s'étend sur l'Europe continentale de l'Atlantique à la Pologne, l'Ukraine, les bords de la Mer Noire et la Turquie. Au nord, il est absent des Îles britanniques et de la Péninsule scandinave. Au sud, il occupe les reliefs de l'extrême nord de l'Afrique. Il est absent des îles de Méditerranée occidentale, mais pas orientale. Les oiseaux les plus orientaux sont dans le Caucase.

Menaces - protection



adulte

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineure

Éteint

à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Le Grimpereau des jardins est généralement une [espèce](#) commune, donc non menacée à l'heure actuelle. Il est cependant localement rare comme dans le Caucase. L'espèce pourrait avoir à souffrir du dépérissement forestier qu'on observe de nos jours du fait des changements climatiques qui affectent directement les arbres, les sécheresses estivales par exemple, et aussi d'atteintes de ravageurs comme la processionnaire du chêne qui affaiblissent des arbres déjà en mauvaise posture. Le risque est donc la coupe sanitaire qui prive brutalement le grimpereau de son habitat.

Références utilisées

- [Les passereaux d'Europe, tome 2](#), P. Géroudet, M. Cuisin
- [Birds of the World](#), The Cornell Lab of Ornithology
- [xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world](#),
- [IOC World Bird List \(v14.2\)](#), Gill, F and D Donsker (Eds). 2024-04-18.