

Moineau domestique - Passer domesticus - House Sparrow

Oiseaux.net

Description de la famille

Les Passeridés sont de petits passereaux de l'Ancien Monde assez compacts, à bec conique adapté à un régime granivore et à ailes courtes et arrondies liées aux habitudes sédentaires d'une majorité des espèces. Leur plumage est peu voyant, excepté chez quelques espèces où le jaune domine... [lire la suite](#)

Identification



♂ adulte



♀ adulte

Connu de tous, le "piaf" est si commun en milieu urbanisé et si peu farouche que le passant ne daigne même plus le regarder, excepté lorsqu'il a quelques miettes à lui lancer. Pourtant, cette petite boule de [plumes](#) sautillante, robuste et effrontée mérite notre attention.

Le Moineau domestique présente un net [dimorphisme](#) sexuel. Le mâle adulte a un plumage sobre mais quand même assez haut en couleur quand on le regarde bien. La tête est remarquable, avec la [calotte](#) grise, la nuque châtain, les [joues](#) blanc sale et la gorge noire se prolongeant en [bavette](#) sur la poitrine. L'œil sombre est inclus dans une zone loreale noire qui se poursuit par dessous tandis qu'un petit trait blanc supraloral est fréquent dans la [sous-espèce](#) domesticus. Le dessus présente des teintes chaudes, marron et chamois, avec des stries noirâtres longitudinales. L'extrémité blanche des [couvertures](#) moyennes forme une petite barre [alaire](#). Le gris clair du dos et du croupion ne se voit que lorsque les [ailes](#) les découvrent, donc surtout à l'envol. Les [rectrices](#) sont brun-gris et bordées de beige. Les parties inférieures sont blanchâtres, teintées de crème ou de gris suivant les endroits. Le [bec](#) fort et conique est noir. Les [pattes](#) sont roses.

La femelle adulte a un plumage plus discret, dépourvu des teintes chaudes du mâle. Les parties supérieures, tête comprise, apparaissent brunes, chamois clair ou beige. Le manteau est strié en long de noirâtre. La barre [alaire](#) blanche est plus fine. Le dos et le croupion bruns ne contrastent pas. La tête brune se caractérise par un [sourcil](#) pâle qui va de l'œil aux côtés de la nuque. Le [bec](#) est brunâtre, avec souvent du jaune à la base de la [mandibule](#) inférieure. Les parties inférieures sont identiques à celles du mâle mais paraissent souvent légèrement striées de sombre.

Le [juvénile](#) est très semblable à la femelle, mais avec des caractères atténués, [bec](#) plus pâle, rosâtre, [sourcil](#) moins net, barre [alaire](#) peu ou pas visible, et dans le premier âge, plumage neuf et commissure buccale jaune apparente.

Les 12 [sous-espèces](#) reconnues ne diffèrent que par des détails de plumage.

Indications subsppécifiques 12 sous-espèces

Passer domesticus domesticus (w and n Europe through n Asia to ne Siberia and n Japan, introduced in the Americas, South Africa and Australia)

Passer domesticus balearoibericus (s Europe. except Italy. to c Turkey)

Passer domesticus biblicus (Cyprus, n Israel and nw Jordan to w Syria and se Turkey to nw Iran.)

Passer domesticus hyrcanus (se Azerbaijan and n Iran)

Passer domesticus persicus (c Iran to w and s Afghanistan)

Passer domesticus indicus (s Israel and s Palestine through Arabia and east to India and c Southeast Asia)

Passer domesticus bactrianus (w Turkmenistan and ne Iran to w China and nw Pakistan)

Passer domesticus parkini (nw and c Himalayas)

Passer domesticus hufufae (ne Arabia)

Passer domesticus tingitanus (nw Africa)

Passer domesticus niloticus (Egypt)

Passer domesticus rufidorsalis (Sudan and Eritrea)

Noms étrangers

[House Sparrow](#),

Gorrión común,

pardal-de-telhado,

Hausperling,

[házi veréb](#),

Huismus,

Passera Europea,

gråsparv,

Gråspurv,

vrabec domový,

vrabec domácí,

Gråspurv,

varpunen,

Huismossie,

pardal comú,

Gráspör,

wróbel (zwyczajny),

mājas zvirbulis,

domači vrabec,

Домовый воробей,

イエスズメ,

家麻雀,

นกกระจอกใหญ่,

家麻雀,

Voix chant et cris



♂ adulte

play

Chez les moineaux, on ne peut pas véritablement parler de [chant](#). Ce sont plutôt des cris à valeur territoriale, brefs et répétés souvent inlassablement sur le territoire, qui tiennent lieu de [chant](#).

Chez le Moineau domestique, qui est sédentaire, le mâle est vocalement actif très tôt, dès janvier. Il affirme son territoire en répétant indéfiniment ses "tchip, tchiup" ou "tchirp", perché sur le faite d'un toit, une cheminée, un chéneau ou tout autre poste proche de la cavité convoitée pour le nid. De cette suite un peu lassante, on peut retenir que c'est ce cri caractéristique qui lui a valu son surnom argotique de piaf.

Les cris sont assez variés. Le cri le plus fréquent est un "tien" de contact, souvent répété deux ou trois fois. Le cri d'alarme habituel, intraduisible, est une suite très rapide de notes, presque un trille, répétée tant que le danger persiste.

Habitat



♂ adulte plum. nuptial

Le Moineau domestique est une des [espèces](#) les plus anthropophiles. Il vit pratiquement partout où

L'homme est présent et a construit des bâtiments, villes et villages, hameaux, fermes isolées,

dans des conditions environnementales acceptables pour lui. Il lui faut un minimum de surfaces végétalisées où il pourra trouver sa nourriture, les matériaux du nid, se réfugier en cas de danger, etc. Il est absent de tous les milieux forestiers fermés ainsi que des endroits trop désertiques.

Une forme d'idéal pour lui est le village rural traditionnel, entouré de zones agricoles à culture extensive et possédant en son sein ou dans son environnement immédiat jardins, vergers, [haies](#), potagers, poulaillers, tas de fumier et de compost,... Il peut là côtoyer son congénère, le [Moineau friquet](#). Très localement en marge de l'aire, on peut trouver de petites [colonies](#) déconnectées de l'habitat humain, par exemple dans la péninsule arabique, et nichant en milieu [arboricole](#).

Comportement traits de caractère



♂ adulte

Deux qualificatifs s'appliquent bien au Moineau domestique, sédentaire et [grégaire](#). Il est probablement l'espèce la plus casanière d'Europe de l'Ouest. Un Moineau domestique né dans un village a toutes les chances d'y passer toute sa vie et il y est visible en toutes saisons. De plus, il recherche toujours la compagnie d'autres individus de l'espèce. Il niche volontiers en [colonies](#) lâches et en période inter-nuptiale, il forme des groupes souvent importants qui peuvent être monospécifiques mais aussi mixtes avec son congénère le friquet. Ils recherchent ensemble leur nourriture, s'exposent ensemble aux rayons solaires en procédant à leur toilette.





♂ adulte

la moindre alerte, par exemple lorsque surgit l'épervier, ils se réfugient tous vivement dans les ligneux denses les plus proches. Ils passent la nuit dans des [dortoirs](#) communs qui peuvent rassembler plusieurs centaines d'oiseaux, serrés les uns contre les autres et donnant de la voix avant la nuit.

Souvent commensal de l'homme, il peut dépendre de lui assez étroitement en fréquentant par exemple les poulaillers où il trouve des graines à sa convenance ou encore les postes de nourrissage hivernal pour les mêmes raisons. Il se nourrit principalement sur le sol, en sautillant et en agitant nerveusement la queue.

La [parade nuptiale](#) est spectaculaire. Plusieurs mâles se rassemblent en criant autour d'une même femelle, le [bec](#) pointé vers le ciel, la poitrine bombée, les [ailes](#) entrouvertes tombant jusqu'au sol, la queue déployée et dressée. La femelle leur répond par des coups de [bec](#) et ils s'envolent. Ces [parades](#) finissent souvent en batailles entre mâles, même en l'absence de femelle. Ils sont néanmoins monogames et s'apparient pour la saison.

Le Moineau domestique se révèle parfois indésirable dans les jardins en s'attaquant aux graines semées et en train de germer, à certaines fructifications comme les jeunes petit pois en gousse, à certains fruits.

Vol



♀ adulte

Le Moineau domestique a un vol puissant, rapide et direct. Les battements sont interrompus par de brefs instants où les [ailes](#) sont collées au corps, mais le vol n'en devient pas pour autant onduleux comme chez les fringilles.

Alimentation mode et régime





♂ adulte plum. nuptial

Le Moineau domestique peut être qualifié d'omnivore. L'adulte se nourrit pour l'essentiel de graines diverses, mais c'est un opportuniste, et il ne dédaigne pas les petits animaux qui restent néanmoins minoritaires dans le régime.



♂ adulte

Dans un contexte anthropique, il sait profiter des ressources d'origine humaine comme dans les élevages, autour des silos à grains, dans les décharges à ciel ouvert, etc.. Son penchant pour les jeunes plantules, les fruits tendres, certains bourgeons, le rend impopulaire auprès des jardiniers. Pendant les premiers jours, les [juvéniles](#) au nid sont nourris exclusivement d'invertébrés, [insectes](#) et leurs [larves](#), par exemple les tipules ou les papillons, qu'il peut capturer au vol, vers de terre, araignées,... Il exploite activement les pullulations de pucerons. Vis à vis de l'Homme, il est donc à la fois utile et nuisible, mais ce dernier terme est à pondérer.

Reproduction nidification





♂ adulte plum. nuptial

Dès la fin de l'hiver, au mois de mars, débute la période de reproduction du Moineau domestique. On assiste alors aux [parades](#) nuptiales décrites plus haut, au choix du site de reproduction que le mâle va défendre vigoureusement de la voix.

L'espèce est plus ou moins cavernicole. Le nid est placé dans une cavité dans les endroits les plus variés, mais toujours à hauteur respectable pour éviter les pillages. C'est une construction en boule, volumineuse, assez lâche et inconsistante, à ouverture latérale. Il est fait d'éléments végétaux (feuilles sèches, en particulier les tiges et les feuilles linéaires des graminées, tigelles et radicelles) et consolidé par des [plumes](#) et du crin.




♂ adulte plum. nuptial

Il est le plus souvent placé sous un toit, dans l'espace laissé entre les [Tuiles](#) et le mur, à condition qu'une certaine vétusté se soit installée permettant l'accès. Une anfractuosit  dans un mur ou une falaise peut lui convenir  galement. Il appr cie aussi les fa ades couvertes d'un lierre  pais tr s protecteur. Il peut occuper  galement certains nichoirs ou alors les nids de l'[Hirondelle de fen tre](#) dont il n'h siste pas   expulser les locataires. Il s'est adapt  r cemment aux lampadaires modernes en nichant derri re l'ampoule, comme le fait aussi l'[ tourneau sansonnet](#). Dans le sud de son [aire](#), une nidification [arboricole](#) non cavernicole n'est pas rare. Le nid est alors port  par une fourche d'arbre ou d'arbuste.

La femelle pond 2   8 œufs, en moyenne 4   5, de 22 X 15 mm, que les deux parents couvent durant 11   14 jours. Les jeunes sont nourris au nid pendant une quinzaine de jours d'abord de [larves](#) et d'insectes auxquels s'ajoutent plus tard des graines ramollies dans le [jabot](#) des parents. Deux semaines apr s l'envol, les adultes peuvent entamer une seconde [nich e](#) qui sera suivie d'une troisi me, voire d'une quatri me dans le meilleur des cas, mais il y a alors beaucoup d' checs.

Distribution



♂ adulte

Le Moineau domestique est une [espèce](#) de l'ancien monde, occupant une [aire](#) très vaste dans les biomes boréal, tempéré et subtropical. Cette [aire](#) s'étend de l'Islande à l'ouest au Kamtchatka à l'est, et du Cap Nord au nord au Sri Lanka au sud.

12 [sous-espèces](#) se partagent cette vaste [aire](#), la [sous-espèce](#) type domesticus, celle qui occupe l'Europe, ayant la répartition la plus vaste, de l'Atlantique à l'ouest de la Chine.

Il a été introduit, volontairement ou non, dans de nombreux endroits du monde, par exemple en Amérique du Nord où il est devenu très commun aux États-Unis et au Canada, au Venezuela, aux Canaries, en Afrique noire (par exemple en Côte d'Ivoire et au Rwanda) en Asie du Sud-Est (Singapour), en Australie, etc.

La plupart des populations sont sédentaires. Seules les [sous-espèces](#) asiatiques bactrianus et parkini sont migratrices.

Menaces - protection



♂ adulte plum. nuptial

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineureÉteint
à l'état sauvageQuasi
menacéNon
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Malgré un déclin certain dû aux changements intervenus dans les pratiques agricoles et les méthodes d'assolement, le Moineau domestique reste un oiseau commun et largement répandu. Mais depuis les années 80, un net déclin s'est amorcé dans les grandes villes, en Europe comme sur le continent américain, qui se poursuit inexorablement. C'est le cas de Paris intra muros d'où le Moineau domestique est en train de disparaître. L'habitat urbain moderne, de plus en plus bétonné, ne procure plus au moineau de quoi se nourrir normalement et la rénovation des bâtiments le prive de ses sites de nidification.

Références utilisées

[Les passereaux d'Europe, tome 2](#), P. Géroutet, M. Cuisin

[Le Moineau domestique](#), BOUCHARD Serge

[Avibase](#), Lepage Denis

[HBW Alive](#),

[xeno-canto](#), [Sharing bird sounds from around the world](#),

[IOC World Bird List \(v14.2\)](#), Gill, F and D Donsker (Eds). 2024-04-18.