

Pinson des arbres - Fringilla coelebs - Eurasian Chaffinch

Oiseaux.net

Description de la famille

Les Fringillidés (fringilles dans le langage courant) sont des passereaux de taille petite à moyenne (9 à 25 cm de longueur). Leur plumage est extrêmement variable et souvent haut en couleurs. Leur bec court et conique est adapté à un régime granivore, mais non exclusif. Ils occupent des mili... [lire la suite](#)

Identification



♂ adulte



♀ adulte

Le Pinson des arbres est un [passereau](#) commun et facile à reconnaître.

Le mâle adulte nuptial est assez bariolé. Le manteau et le haut du dos sont d'un brun-marron chaud. La tête est d'un gris-ardoise bleuté, excepté le front qui est noir et l'ensemble "lores, [joues](#) et [couvertures](#) auriculaires" qui est châtain. Le [bec](#) est gris bleuté. Deux larges barres blanches séparées de noir sur les [couvertures alaires](#) sont diagnostiques et très visibles, au posé comme en vol. Celle des grandes [couvertures](#) tend souvent vers le jaune clair. Les [rémyges](#) sombres sont ourlées de jaune. Le croupion et les sus-caudales sont olive. La queue sombre montre du blanc aux deux paires de [rectrices](#) externes. Les parties inférieures sont d'un rose vineux prononcé, avec parfois une nuance roussâtre. Le bas ventre et les sous-caudales sont blancs. Les [pattes](#) sont rosâtres. En hiver, les couleurs sont atténuées et c'est l'usure du plumage qui fera apparaître les belles couleurs sous-jacentes pour la reproduction.

La femelle a un plumage beaucoup plus discret. Le manteau est d'un brun terne. La tête et le dessous sont d'un beige nuancé de gris, excepté les sous-caudales qui sont blanches. La [calotte](#) est plus sombre, avec souvent une ligne médiane plus claire. L'œil est cerclé de blanc. Le [bec](#) est gris rosâtre ou corne. Les [ailes](#) portent les mêmes barres blanches et la queue les mêmes [rectrices](#) externes blanches que le mâle, mais le blanc est moins étendu. Le croupion est verdâtre aussi.

Le [juvénile](#) est encore plus terne que la femelle. Heureusement, le blanc des [ailes](#) et de la queue permet de le reconnaître. Il a une tache pâle sur la nuque.

Dans les îles de Macaronésie et en Afrique du Nord, on trouve des [sous-espèces](#) bien différenciées de la ssp type. Elles sont plus sombres dessus (tête bleue et manteau vert ou bleu) et le dessous plus pâle, plus saumoné que vineux.

Indications subsppécifiques 7 sous-espèces

- Fringilla coelebs coelebs (Europe. except British Isles, Sardinia. to c Asia, w, n Turkey, c and e Caucasus and nw Iran.)
- Fringilla coelebs gengleri (British Isles)
- Fringilla coelebs solomkoi (Crimea and sw Caucasus)
- Fringilla coelebs sarda (Sardinia)
- Fringilla coelebs syriaca (Cyprus, se Turkey to n Iraq and Jordan)
- Fringilla coelebs alexandrovi (n Iran)
- Fringilla coelebs transcaspia (ne Iran and sw Turkmenistan)

Noms étrangers

- [Eurasian Chaffinch](#),
- Pinzón vulgar,
- tentilhão-comum,
- Buchfink,
- [erdei pinty](#),
- Vink,
- Fringuello,
- bofink,
- Bokfink,
- pinka obyčejná,
- pěnkava obecná,
- Bogfinke,
- peippo,
- Gryskoppie,
- pinsà comú,
- Bókfinka,
- zięba (zwyczajna),
- žubīte,

- ščinkavec,
- Зяблик,
- ズアオアトリ,
- 苍头燕雀,
- นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู,
- 蒼頭燕雀,

Voix chant et cris



♂ adulte

- play
-

Le cri habituel est un "fink" sonore, souvent répété deux ou trois fois. C'est un cri de contact entre individus. Un "trrrrii" fort et roulé peut être considéré comme un cri d'alarme. En vol, un "tiup" typique est répété à intervalles réguliers, par exemple de la part de [migrateurs](#) en [migration](#) active.

Le [chant](#) est stéréotypé et assez constant à l'intérieur de l'espèce. C'est une phrase sonore qui peut se traduire ainsi "tji tji tji tji tiup tjiup tjiup tu tu tu ui tu".

Habitat



♂ adulte plum. nuptial

Le Pinson des arbres est une [espèce](#) typiquement forestière à l'origine, mais qui est capable de s'adapter à de très nombreuses situations en terme d'habitat.

En fait, il est capable d'occuper tous les milieux arborés, depuis les forêts profondes jusqu'au

cœur des grandes villes à la faveur des parcs et jardins, et du niveau de la mer jusqu'à la limite supérieure de la forêt en altitude, et ce sur une large bande latitudinale. Il a une plasticité écologique extrême qui en fait un de nos oiseaux les plus communs. Il est souvent le [passereau](#) dont la densité est la plus élevée en forêt. Par exemple en Grande Bretagne, une étude a trouvé une densité de plus de 600 oiseaux au km² en période de reproduction.

Les [migrateurs](#) fréquentent également les milieux ouverts, particulièrement les cultures, lors des haltes migratoires, à la recherche des graines dont ils tirent leur énergie. En cas de danger, ils se réfugient dans les [haies](#) et les bosquets proches.

Comportement traits de caractère



♂ adulte plum. nuptial

Le Pinson des arbres est un oiseau volontiers [grégaire](#), excepté pendant la reproduction. À ce moment, il devient territorial et les mâles défendent vivement leur territoire, le marquant de leur [chant](#).



♂ adulte

C'est pourquoi les mâles chantent le plus souvent en évidence sur un perchoir élevé.

Au sol où il recherche sa nourriture, le Pinson des arbres se déplace en sautillant. Quand il n'est pas au sol, il est branché dans les ligneux. Il est [arboricole](#) pour la reproduction. Le nid est construit sur une branche, en général assez bien camouflé.

Nos pinsons sont volontiers sédentaires ou tout au moins erratiques, et sont visibles toute l'année. On peut aussi remarquer qu'en Europe de l'Ouest, lors des deux [migrations](#), le Pinson des arbres est l'espèce qui en nombre domine toujours. Ce sont des vagues de milliers d'oiseaux qui défilent alors. Ces [migrations](#) concernent les oiseaux des hautes latitudes hivernant plus au

sud. Ce sont eux qu'on peut voir en halte en grand nombre dans les champs en mars et octobre. Un trait de comportement original est à mettre en exergue chez cette [espèce](#), c'est la ségrégation qui se produit en période inter-nuptiale. Les mâles d'un côté, les femelles et les jeunes de l'autre, forment des groupes séparés, qui migrent séparément, se nourrissent séparément lors des haltes. C'est ce trait de caractère qui est traduit dans le nom scientifique de l'espèce, à savoir *coelebs*, ce qui veut dire célibataire.

Vol



♂

Le Pinson des arbres, comme tous les fringilles dont il est l'exemple type, a un vol direct et onduleux, alternant les phases de battements vifs et de repos [ailes](#) fermées. C'est un grand [migrateur](#) capable de voler sur de longues distances.

Alimentation mode et régime



♂

Le Pinson des arbres est un [omnivore](#), ce qui contribue certainement à son abondance. Ce régime varie suivant les saisons.



♂ adulte

Il est plutôt [insectivore](#) à la belle saison. Les jeunes en particulier sont nourris entièrement d'invertébrés. Les proies animales sont extrêmement variées, mais avec une majorité d'insectes et leurs [larves](#). En période inter-nuptiale, les graines dominent largement dans le régime. Ce sont les graines qui fournissent l'énergie nécessaire aux [migrateurs](#). En plus de cela, il consomme aussi des fleurs et des bourgeons, items riches en protéines et glucides.

Reproduction nidification



♀ adulte plum. nuptial

Dès le mois de mars et en avril, la femelle construit le nid sur le territoire que le mâle défend de la voix.



♀ adulte plum. nuptial

Ce travail lui revient car le mâle est occupé à temps plein par la défense territoriale. Le nid est construit assez haut dans un arbre assez branchu, dans une fourche ou posé sur une branche, et fait corps avec son support. Il est fait de mousse, de fibres végétales et de radicelles, le tout assemblé avec de la soie d'araignée. Un revêtement extérieur de lichens est classique. La coupe est tapissée intérieurement de [plumes](#) et de poils. Le tout est une œuvre soignée, plutôt petite pour la taille de l'oiseau et qui se confond avec son environnement d'écorce moussue ou de lichens.

La femelle pond 4 à 5 œufs bleutés et tachetés de 20 x 14 mm qu'elle couve seule de 12 à 14 jours. Les parents s'occupent ensemble de l'élevage des jeunes et les nourrissent surtout d'arthropodes (insectes surtout). Le séjour au nid est d'une 15e de jours. Le succès à l'envol est en moyenne de 3 à 4 jeunes par [nichée](#) réussie. Une fois la première [nichée](#) émancipée, les pinsons ont le temps d'engager une seconde reproduction du fait de la précocité de la première. L'envol se produit en juin-juillet.

Distribution



♂ adulte

Le Pinson des arbres est une [espèce](#) de l'ouest du continent eurasiatique. Son [aire](#) s'étend de l'Europe occidentale à la Sibérie centrale, atteignant à l'est le lac Baïkal. Il monte en latitude jusqu'au nord de la péninsule scandinave et en Sibérie occidentale. Au sud, des [sous-espèces](#) bien typées occupent les îles de Macaronésie (Açores, Madère et Canaries) et l'extrême nord de l'Afrique. Les populations nordiques et orientales sont migratrices partielles et viennent hiverner en climat tempéré et méditerranéen, sans outrepasser l'aire de reproduction, excepté localement à l'est.

Menaces - protection



♂ adulte plum. nuptial

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineure

Éteint
à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Cette [espèce](#), largement forestière, est très commune et non menacée. Les études récentes ont montré que le déclin actuel des [passereaux](#) concernait surtout les [espèces](#) de milieux ouverts, tout particulièrement des milieux agricoles. Les oiseaux forestiers sont moins touchés.