

# Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros - Black Redstart

*Oiseaux.net*

## Description de la famille

Les Muscicapidés sont des passereaux de taille petite à moyenne (10 à 20 cm de longueur). Dans un premier temps, ils regroupaient principalement les gobemouches au sens large. Mais les recherches récentes ont montré qu'il fallait leur adjoindre certains taxons appartenant jusqu'alors aux Sylvii... [lire la suite](#)

## Identification



♂ adulte plum. nuptial



♀ adulte

Le Rougequeue noir est un petit [passereau](#) au plumage sombre et discret, se trouvant fréquemment dans un environnement humain, mais pas exclusivement. Dans son [aire](#) très vaste, allant de l'Europe de l'Ouest à la Chine de l'Est, l'espèce présente 5 [sous-espèces](#) qui diffèrent suffisamment pour être facilement distinguées, au moins pour les mâles.

Le mâle nuptial de la ssp "gibraltariensis" de l'ouest de l'Europe, celle qui occupe la France, paraît tout noir de loin. En fait, de près, on voit que les parties supérieures sont d'un gris-anthracite sur lequel se détache nettement sur les [ailes](#) une zone blanchâtre constituée par les bordures externes des [rémiges secondaires](#). C'est l'avant du corps qui est noir, front, [lores](#), [parotiques](#), gorge et poitrine, plus ou moins largement suivant les individus. Sur ce fond noir, l'œil très sombre ne ressort pas du tout. Souvent un peu de blanchâtre est visible en arrière du front noir. Le ventre présente un dégradé de gris de l'avant vers l'arrière. Tout l'arrière du corps, croupion et sus-caudales, bas ventre et sous-caudales, est orange vif. La queue est d'un brun-gris sombre au niveau des [rectrices](#) centrales tandis que les [rectrices](#) externes sont orange, l'ensemble étant typique de la plupart des [espèces](#) de rougequeues et bien visible à l'envol. [Bec](#) et [pattes](#) sont noirs.

Le plumage nuptial complet n'est acquis qu'à l'âge de deux ans. Les mâles d'un an sont plus gris, moins noirs et souvent ne présentent pas de zone claire sur l'aile. Ils peuvent ainsi être pris pour des femelles. Malgré cela, ils sont capables de se reproduire.

La femelle est d'un gris-souris, nuancé de brun sur les [parotiques](#) et avec les [ailes](#) plus sombres sans zone pâle.

Le dessous est d'un gris-beige parfois nuancé de fauve. La queue est identique à celle du mâle. Les sous-caudales sont orange pâle.

Le [juvénile](#) ressemble à la femelle, mais il est plus sombre dessus comme dessous. Les premiers temps, les commissures jaunes attestent du jeune âge.

Les [sous-espèces](#) se différencient à l'importance de la couleur orange des parties inférieures du mâle. Il y a une variation clinale entre la [sous-espèce](#) occidentale "gibraltariensis" chez laquelle seuls le bas-ventre et les sous-caudales sont orange, et la ssp la plus orientale "rufiventris" chez laquelle la totalité du ventre et le bas de la poitrine sont orange, ce qui est déroutant pour un européen. Même variation pour la couleur du manteau et des [couvertures](#) qui passe de gris sombre à l'ouest au noir à l'est. De son côté, la zone pâle de l'aile a tendance à s'atténuer d'ouest en est, pour disparaître chez rufiventris. Le mâle de la ssp asiatique "phoenicuroides" est troublant, comme son nom le laisse entendre. Dépourvu de zone pâle sur l'aile et montrant une tache pâle en arrière du front noir, il évoque le [Rougequeue à front blanc](#) mâle, ou encore un mâle [hybride](#) ochruros x phoenicurus.

## Indications subspécifiques 6 sous-espèces

- Phoenicurus ochruros ochruros (Turkey to the Caucasus and nw Iran)
- Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Europe and nw Africa)
- Phoenicurus ochruros semirufus (w Syria, Lebanon and ne Israel)
- Phoenicurus ochruros phoenicuroides (ne Iran and Turkmenistan to nw Pakistan north to se Kazakhstan, nw China, sc Siberia and w Mongolia)
- Phoenicurus ochruros murinus ( )
- Phoenicurus ochruros rufiventris (Central Himalayas to c China)

## Noms étrangers

- [Black Redstart](#),
- Colirrojo tizón,
- rabirruivo-preto,
- Hausrotschwanz,
- [házi rozsdafarkú](#),
- Zwarte Roodstaart,
- Codirosso spazzacamino,
- svart röstjärt,

- Svartrødstjert,
- žltouchvost domový,
- rehek domácí,
- Husrødstjert,
- mustaleppälintu,
- cotxa fumada,
- Húsaskotta,
- kopciuszek (zwyczajny),
- melnais erickiņš,
- šmarnica,
- Горихвостка-чернушка,
- クロジョウビタキ,
- 赭紅尾鷓,
- นกเขนสีดำ,
- 赭紅尾鷓,

## Voix chant et cris



♂ adulte plum. nuptial

- play
- 

Le [chant](#) est une phrase assez courte qui commence par un grincement retenu qui rappelle le bruit d'un papier que l'on froisse et qui se poursuit par la répétition rapide d'une note "tu tu tu tu" qui rappelle le [Rougequeue à front blanc](#).

Deux cris habituels peuvent être notés, qui traduisent tous les deux une certaine inquiétude des adultes face à un danger. Tout d'abord un "sit" assez incisif et souvent répété, dont la fréquence de répétition traduit le degré d'inquiétude. Le second est un "tec", lui aussi volontiers répété par séries de 3 ou 4 notes. Ces cris peuvent durer de longues minutes, jusqu'à ce que le danger disparaisse.

Le cri du [juvénile](#) est un "tsi kr" sec bisyllabique. C'est un cri de quémante de la nourriture. Il permet aux parents de connaître la position de leurs jeunes pour un nourrissage plus efficace.

## Habitat



♂ adulte plum. nuptial

Le Rougequeue noir est très lié aux milieux rupestres, qu'ils soient naturels (falaises, éboulis rocheux, versants rocailleux, ravins, etc.

ou artificiels (constructions humaines de toutes sortes), car sa nidification est rupestre. On peut penser qu'avant que l'Homme ne se mette à construire, l'espèce n'était pas anthropophile mais liée aux milieux naturels à substrat rocheux apparent.

Il apprécie les espaces dégagés quels qu'ils soient comme zones de chasse. Il les trouve sur les versants montagneux, dans les espaces agricoles, sur les rivages maritimes, en milieu urbain, entre autres. Il est absent dès que le taux de [couverture](#) par les ligneux atteint le seuil d'environ 25%, et ce au profit de son congénère le Rougequeue à front blanc qui prend alors le relais. Son adaptation au milieu urbain lui a permis d'étendre son [aire](#) en plaine.

## Comportement traits de caractère



Le Rougequeue noir est un oiseau assez peu farouche. On le repère à ses cris et à son [chant](#) lorsqu'il est posé en évidence, ne cherchant pas à se cacher. Son [chant](#) contribue à l'ambiance sonore des villages ruraux au printemps. En milieu urbain, ce [chant](#) sonore arrive à percer le bruit de la ville.

L'oiseau est le plus souvent vu perché sur un support dégagé (piquet, fil, buisson, branche basse d'un arbre) d'où il surveille le sol alentour pour repérer ses proies sur lesquels il fond d'un vol direct. Au sol, il se déplace en sautillant.



♂ adulte

toute occasion, il agite nerveusement la queue verticalement d'un curieux mouvement mécanique. Lorsqu'il est inquiet, il s'envole d'un vol aisé et direct vers un refuge, arbre, bâtiment ou rocher.

Il n'est pas [grégaire](#), mais au moment des passages, de petits groupes, le plus souvent moins de 10 individus, peuvent être observés dans les endroits favorables. En saison de reproduction, les groupes les plus importants sont les groupes familiaux.

Le Rougequeue noir est monogame et territorial. Lorsque l'habitat est optimal, les territoires peuvent être contigus. Les intrus sont pourchassés par les titulaires avec force cris.

Toujours perché en évidence, que ce soit sur un rocher ou le faite d'un toit, le mâle lance son [chant](#) comme un défi envers ses congénères. Il affirme là son territoire qu'il défendra tout au long de la belle saison. Il chante avant même le lever du soleil, puis tout au long du jour en début de reproduction, avant que son rôle de père nourricier ne l'accapare. Après l'envol, ce sont les cris grésillants des jeunes quémendant leur nourriture qui attirent l'attention des adultes comme la nôtre.

## Vol



♂ adulte plum. nuptial

Le Rougequeue noir a un vol aisé et direct, à battements réguliers typiques de la [famille](#) des Muscicapidés. C'est en milieu montagnard qu'il exprime le mieux ses capacités quand d'un coup d'aile, il gagne le haut d'une falaise. Il sait pratiquer le [vol sur place](#), par exemple quand il s'agit de saisir un [insecte](#) sur une paroi rocheuse ou un mur.

## Alimentationmode et régime



♀

Le Rougequeue noir est avant tout un [insectivore](#) qui se nourrit de divers invertébrés terrestres, principalement d'insectes et/ou de leurs [larves](#), mais également d'araignées, de millepattes, de petits [mollusques](#), de petits lombrics, etc.



juvénile

En bord de mer, il peut consommer de petits [crustacés](#) intertidaux. Il se nourrit aussi de petits fruits et de baies dès que l'avancée de la saison lui en offre. Les graines sont marginales dans son régime.

Il lui faut pour chasser des espaces dégagés à sol nu ou peu végétalisé. Il repère ses proies depuis un poste d'affût dominant et les capture au sol le plus souvent. Il peut aussi les rechercher en voletant d'un caillou ou d'une motte à l'autre. Il sait aussi capturer au vol des [insectes](#) posés sur une paroi rocheuse ou un mur, moins fréquemment des [insectes](#) volants. Les petits fruits sont cueillis en place et non ramassés au sol.

## Reproduction nidification



La nidification du Rougequeue noir est semi-cavernicole. Il recherche pour nicher toutes sortes d'anfractuosités plus ou moins ouvertes, le plus souvent protégées par un surplomb qui le

confine, et ce en milieu "rupestre".



♂ adulte plum. nuptial

Sur un bâtiment, le nid sera souvent construit sous le toit, en haut du mur ou sur un élément de charpente à condition qu'ils soient accessibles. En montagne, une anfractuosit  dans une fissure ou un espace  rod  entre deux strates g ologiques accueillera le nid.

Le nid, construit par la femelle, est un assemblage assez lâche et peu structur  d' l ments v g taux secs (herbes, paille, feuilles, mousse). La coupe est tapiss e de poils et de [plumes](#) qui le rendent douillet. La femelle y d pose 4   6  ufs blancs brillants qu'elle couvera seule environ 13 jours. Les jeunes sont nourris au nid pendant une 15e de jours, puis encore 15 jours   3 semaines apr s leur envol. Souvent, la [famille](#) se scinde en deux   ce moment, m le et femelle prenant en charge chacun de leur c t  une partie de la fratrie. Une seconde [nich e](#) pourra suivre rapidement d s que la femelle sera lib r e de sa t che de nourrici re.

## Distribution



♀ adulte

Le Rougequeue noir est une [esp ce](#) eurasiatique dont l'aire de r partition s' tend de l'Atlantique   l'est de la Chine, essentiellement aux latitudes moyennes. Cette [aire](#) peut se r soudre en deux

ensembles, l'un occidental couvrant l'Europe (ssp gibraltariensis) et l'Asie mineure (ssp ochruros), l'autre oriental et asiatique (ssp phoenicuroides et rufiventris) auxquels s'ajoute une petite population moyen-orientale (ssp semirufus).

La Scandinavie et la Russie ne sont occupées que très marginalement au sud, preuve que l'espèce n'a pas d'affinités boréales. L'espèce n'est pas commune au Royaume Uni.

Au sud de l'aire, le Rougequeue noir recherche en revanche l'altitude pour échapper à un climat trop chaud. C'est ainsi qu'on le trouve dans les atlas marocains, les montagnes du nord de l'Algérie, celles d'Iran, et plus à l'est les montagnes d'Asie centrale, puis Pamir et Himalaya.

En hiver, les oiseaux des latitudes les plus élevées descendent vers le sud et gagnent par exemple le pourtour du bassin méditerranéen à l'ouest. À l'est, les [migrateurs](#) se répandent sur le sous-continent indien, la péninsule arabique et le nord-est de l'Afrique. Ce sont de véritables [migrateurs](#). Les oiseaux montagnards du sud effectuent simplement une [migration](#) altitudinale.

## Menaces - protection



♂ adulte plum. nuptial

### Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Le Rougequeue noir est largement répandu et souvent commun dans son habitat. Il n'est pas considéré menacé par Birdlife International.

## Références utilisées

- [Avibase](#), *Lepage Denis*
- [HBW Alive](#),
- [xeno-canto](#), *Sharing bird sounds from around the world*,

- [Les passereaux d'Europe, tome 1](#), P. G  roudet, M. Cuisin
- [IOC World Bird List \(v14.2\)](#), Gill, F and D Donsker (Eds). 2024-04-18.